

API DOUBLE ROSE - A020

Variété ancienne cultivée dans l'Agenais avant le XIX^e siècle jusque vers 1950, mais n'ayant probablement jamais été produite en verger professionnel. Variété caractérisée par son port spur (mot anglais désignant soit un rameau court, soit un arbre ayant beaucoup de rameaux courts) de faible vigueur, sa faible sensibilité aux parasites, son débourrement et sa floraison tardifs, un pédoncule extrêmement court, et surtout l'absence d'acidité de son fruit.

Maturité : tardive (récolte entre le 15 et le 25 octobre) – de longue conservation

Floraison : moyenne à mi-tardive, à pétales pâles

Débourrement : tardif

Fruit de calibre moyen à gros, globuleux aplati très régulier.

Pédoncule très court entraînant une difficulté de cueillette.

Œil petit, fermé à mi-clos dans une cuvette assez profonde et assez large, plissée.

Épiderme d'une belle coloration rouge violacé couvert d'une pruine blanche lui donnant un aspect mat, rosé, devenant extrêmement brillant une fois enlevée, vert dans la cuvette pédonculaire.

Chair très blanche, ferme, fine, très douce, sucrée, craquante, juteuse.

Analyse des jus :

fin septembre : acidité malique : 6 ; indice réfractométrique : 12.

mi-décembre : acidité malique : 3,35 (très faible niveau d'acidité) ; indice réfractométrique : 13,9 (sucré).


Arbre assez vigoureux, à port semi-érigé, à axe dominant, peu ramifié, de type II de fructification*, produisant sur bois âgé.

Les bourgeons terminaux de ses rameaux ne se mettent pas rapidement à fleur et les bourses terminales tardent à venir.

Alternante à la coursonne, la fructification peut parfois revenir deux années consécutives si la pousse de bourse est longue (dans la mesure où l'arbre n'a pas été trop chargé l'année précédente).

Variété très rustique, très peu sensible aux parasites et maladies.

Résultat du test réalisé par l'INRA d'Angers par inoculation en serre de souches de races communes de tavelure sur variétés greffées sur porte-greffe vigoureux : Résistance polygénique avec très légère sporulation.



La mise à fruit terminale tarde.
Haut : cependant fruit sur fruit si l'arbre n'est pas trop chargé.
Bas : alternance de production.