

Beausoleil



Très joli petit fruit commun en Charente limousine et nord-ouest de la Dordogne.

Maturité : très tardive (récolte début novembre) – très longue conservation (mai)

Floraison : mi-tardive, bouton gonflé de couleur rose foncé

Fruit de petit calibre, tronconique allongé, régulier, proche de la forme de Bondon, souvent dissymétrique à épiderme rouge-violet intense pruneux.

Pédoncule court renflé à l'extrémité, inséré dans une cuvette moyenne.

Œil fermé dans une cuvette large, peu profonde et très plissée.

Chair blanche ferme, croquante, très équilibrée, très juteuse, agréable crue et bonne en compote.

Arbre assez peu vigoureux, érigé, à ramifications mi-ouvertes, à mise à fruit précoce, fertile, à feuilles allongées.


De type III à IV de fructification*, le bois est très grêle et de couleur violette. Les pousses de bourse sont majoritairement des brindilles



couronnées. Les coursonnes produisent de trois à quatre fruits par inflorescence. Malgré une forte charge l'année précédente, le retour à fruit est assuré. Beausoleil n'alterne pas.

Variété rustique, peu sensible à la tavelure et aux pucerons cendrés.

Résultat du test réalisé par l'INRA d'Angers par inoculation en serre de souches communes de tavelure sur variétés greffées sur porte-greffe vigoureux : Résistance polygénique avec belles réactions de résistance.



Fruit sur fruit.
Les pousses de bourse
sont majoritairement
des brindilles couronnées.