

Court-Pendu gris du Limousin - Reinette grise du Limousin - A076 - A078

Variété anciennement cultivée en Limousin, encore très commune. En Corrèze, où les arbres de haute-tige sont d'une très grande vigueur, la couronne est de forme rectangulaire ou carrée.

Maturité : très tardive, récolte troisième semaine d'octobre (avant une chute souvent précoce des fruits), début de consommation décembre, conservation jusqu'en avril

Floraison : précoce. Les fleurs sont grosses, blanches et parfumées

Fruit de gros à très gros calibre, globuleux élevé. Épiderme vert liégeux homogène sur les pôles et plus diffus sur le reste de l'épiderme, cuivré à forte insolation, rugueux.

Pédoncule court, inséré dans une cuvette régulière, profonde et étroite.

Œil fermé dans une cuvette assez profonde, évasée et plissée.

Chair de très bonne qualité gustative, jaunâtre, dense, juteuse, très sucrée et très acidulée, dont la qualité gustative se maintient très longtemps pendant l'hiver, les fruits conservant un bon niveau de sucre et d'acidité.

Analyse des jus mi-décembre : acidité malique : 11 (élevée) ; IR : 16,4 (très élevé).

Variété à croquer, à compote ou au four.

Arbre très vigoureux, triploïde et de forme tronconique sur porte-greffe vigoureux, avec une forte dominance de l'axe à ramifications mi-ouvertes.

C'est un type III de fructification (classification pour la répartition et l'évolution des organes fructifères chez le pommier). Les branches fruitières ploient sous le poids des fruits dès l'âge de 3 ans. La mise à fruit est rapide.

On peut observer une alternance (la variété ne peut fleurir ni fructifier tous les ans) de production sur coursonnes courtes si l'arbre est chargé ou mal éclairci, mais les brindilles couronnées sont fréquentes.

Cette tendance au retour à fruit est confortée par une aptitude assez générale à ne produire qu'un seul fruit par inflorescence. De fait, il est généralement à production régulière, très fertile, sans éclaircissage.

Les feuilles sont épaisses, très saines.

Variété rustique, très peu sensible aux maladies sur feuillage et sur fruits, légèrement sensible aux pucerons cendrés.

Résultat du test réalisé par l'INRA d'Angers par inoculation en serre de souches de races communes de tavelure sur variétés greffées sur porte-greffe vigoureux : Résistance forte sans sporulation.



Alterne sur coursonne pas au niveau de l'arbre. Ici, retour à fruit si l'arbre est chargé modérément. ... Faisons-lui une fleur, c'est une bien belle variété !