

De Livre ou Rateau gris



Souvent confondue avec la poire Catillac à cause de sa taille volumineuse, la poire de Livre s'en distingue cependant par la forme du fruit et un arbre très différent, de vigueur moyenne à ramifications grêles, longues et arquées. Cette variété a été commercialisée en pépinière sous le nom de Rateau gris (comme ce fut le cas de la pépinière bordelaise Gérard-Catros à la fin du XVIII^e siècle) ou encore Gros Rateau gris. Leroy précise que les Romains cultivaient déjà un poirier De Livre au I^{er} siècle de l'ère chrétienne. Mais aucune description des fruits n'ayant été établie, mis à part qu'ils étaient volumineux, rien ne nous permet d'affirmer qu'il s'agit bien de la même variété. Cette appellation fut citée pour la première fois dans la littérature en 1587, mais c'est soixante-cinq ans plus tard qu'apparaît la description et donc la preuve qu'il s'agit bien de la variété dont nous avons hérité. Il était signalé comme un arbre de vigueur trop faible sur cognassier, qui nécessite un greffage sur franc, en raison de sa fertilité assez importante.

Origine : Dordogne
Maturité : janvier – fin février
Floraison : moyenne
Débourrement : précoce

Fruit très gros, piriforme, de poids fréquemment supérieur à la livre. Forme

ventrue à la base, se rétrécissant vers le pédoncule, plus renflée d'un côté que de l'autre, bosselée à l'insertion du pédoncule. Pédoncule de longueur moyenne à assez long, assez gros, renflé à la base, légèrement arqué, souvent attaché en dehors de l'axe du fruit. La cuvette est absente. Œil grand, régulier, mi-fermé, enfoncé dans une cuvette assez profonde et étroite.

Épiderme vert jaunâtre maculé de rouge brique à l'insolation, légèrement liégeux au niveau des cuvettes, ponctué de lenticelles marron sur le vert et blanc verdâtre sur la zone colorée.

Chair blanchâtre, mi-fine, cassante, peu sucrée et non parfumée. Bonne qualité après cuisson.

Arbre très vigoureux de type III de fructification*.


Sa ramification bien dominée par le tronc a des angles assez ouverts et se met rapidement à fruit pour s'incliner davantage sous le poids de la charge.

Les bourses terminales se mettent en place vers la troisième année.

Cette variété alterne à la coursonne ; cependant, quelques bourses produisent fruit sur fruit.

La production peut se désynchroniser : chaque année, seulement une partie des coursonnes portera des fruits, l'autre partie se préparant pour l'année suivante.

La poire De Livre peut produire régulièrement mais il sera nécessaire de bien éclaircir tôt en saison.



Semble ne pas alterner.
 Quelques « bourses sur bourses ».