

## Pomme Taupe A386



Cette variété était aussi quelquefois appelée **Pomme Boulange** en raison de son utilisation pour la « croustade ».

**Maturité** : automne (cueillette entre le 1<sup>er</sup> et le 10 octobre) – conservation moyenne jusqu'en début d'hiver (janvier)

**Floraison** : mi-précoce

**Débournement** : précoce. Un feuillage déjà très développé est observé en période de pleine floraison

**Fruit** de calibre moyen à assez gros, globuleux légèrement aplati.

Pédoncule très court, inséré dans une cuvette profonde très étroite.

Œil mi-clos dans une cuvette oculaire assez large et profonde, côtelée parfois très fortement.

Épiderme dont la coloration est typique, très intense et brillante, jaune paille soutenu, maculé en plein soleil de rouge vermillon.

Cette coloration superficielle est extrêmement photosensible; elle peut se décroquer très nettement autour d'une feuille ou d'un rameau qui laisse l'épiderme à l'ombre.

**Chair** blanche, juteuse, assez acide, toutefois bien sucrée, de bonne qualité gustative, de longue conservation mais à tendance à devenir farineuse.


Pomme à cuire ou à jus, utilisée aussi pour le cidre.

**Arbre** vigoureux, très ramifié, à ramifications mi-ouvertes à bois souple qui s'inclinent, au feuillage abondant, vert foncé, brillant, très sain, de type II de fructification\*.

La floraison en position latérale sur bois âgés de 1 an est fréquente et l'extinction\* naturelle de bourgeons assez importante.

Les coursonnes courtes alternent mais se désynchronisent. En année de faible production, un retour à fruit sur brindilles couronnées, issues de coursonnes qui n'alternent pas, peut être observé.

Une extinction artificielle de coursonnes en surombre et mal placées, et un éclaircissage manuel des fruits peuvent renforcer ce retour à fruit.



Après une année sans fruit (cicatrices au centre), une brindille couronnée porte une fleur latéralement. Cette fleur et son fruit auront beaucoup de retard sur la fructification terminale.

