

Pomme d'Anis, Fenouillet A006



Maturité : tardive (récolte fin septembre) – conservation janvier
Floraison : mi-précoce

Fruit de petit calibre arrondi. Épiderme assez rugueux, couvert de liège marron assez foncé, maculé sur une grande surface de roux foncé.

Chair vert jaunâtre, assez dure et assez peu juteuse.

Arbre de type II de fructification*, présentant une alternance* à la coursonne et à l'arbre avec possibilité de désynchronisme sur les coursonnes courtes. Sa fertilité est nettement inférieure aux autres Pommes d'Anis.

La sensibilité de l'arbre à la tavelure est très supérieure aux autres variétés de Pommes d'Anis.

Résultat des tests INRA/PV de comportement au feu bactérien par inoculation de souches bactériennes sur pousse : Moyennement sensible.



Pomme d'Anis jaune A009



Maturité : mi-tardive
Floraison : moyenne à mi-tardive

Fruit de calibre moyen à assez petit, globuleux, plus large que haut, très légèrement conique au pôle oculaire.

Pédoncule court à très court, enfoncé dans une cuvette profonde à très profonde et étroite.

Œil fermé à sépales verts dans une cuvette de taille moyenne de la largeur de l'œil, au bord très lisse.

Épiderme vert jaunissant, légèrement ponctué de liège clair sur quelques zones de l'épiderme et dans la cuvette oculaire, orangé à forte insolation.

Chair jaunâtre à texture consistante assez granuleuse, peu juteuse, sucrée, peu acidulée, développant un parfum spécifique agréable, mais présentant une oxydation extrêmement rapide et intense.

Arbre vigoureux à ramification acrotonne qui provoque un bon éclairage au centre de l'arbre, de type II et III de fructification*. Alterne à la coursonne mais de fructification beaucoup plus régulière que les autres Pommes d'Anis grâce à son désynchronisme caractéristique de la fructification des coursonnes.

Pomme d'Anis tardive A001



Maturité : très tardive (récolte fin novembre) – conservation naturelle qui peut atteindre mars, à condition de conserver les fruits dans une atmosphère humide pour limiter leur déshydratation, facteur de flétrissement
Floraison : mi-tardive

Fruit de calibre moyen, arrondi légèrement aplati. Pédoncule court.

Œil fermé inséré dans une cuvette assez profonde de la largeur de l'œil.

Épiderme liégeux vert foncé devenant vert doré, mais assez brillant.

Chair verdâtre, très dense, moyennement juteuse, sucrée et faiblement acidulée, développant elle aussi son parfum anisé dans les sols lourds.

