

LA POPULATION DES « RENÉ VERT, REINE VERT »

Variété-population de Dordogne que l'on retrouve aussi dans le sud de la Corrèze. Chasset en 1948 a associé sous une même description les variétés Troche de Charente, Sucre vert et Suire des Deux-Sèvres, Corrèze et Dordogne, Reinette verte et Reinette de Périgord. Nous sommes certains que Suire est une variété très différente, que nous avons rapprochée du groupe des Paradis et Vignerottes, pommes à cidre limousines. La Troche que nous avons obtenue en Vendée ne correspond pas à la René vert non plus. En revanche, il est fort possible que les synonymes de **Reinette verte** et **Reinette du Périgord** aient été employés en Dordogne où cette variété a fait l'objet d'un commerce assez important. En fait, le seul point commun de tous ces fruits est de parvenir à maturité totalement verts. Par contre, parmi les vrais René vert, le Conservatoire d'Aquitaine a mis en évidence trois clones, qui bien que portant des fruits similaires, ont un comportement de l'arbre différent. Cette population compte les clones A276 et A277, A278, A280. Population variétale très rustique, au très bon comportement vis-à-vis des parasites et maladies.

Origine : Dordogne, Corrèze, Tarn-et-Garonne

Maturité : tardive, récolte entre le 28 octobre et le 10 novembre, de longue conservation.

Floraison : moyenne à mi-tardive. L'arbre fleurit abondamment, les pétales sont rose pâle.

Fruit de calibre moyen à assez gros, arrondi aplati, quelquefois légèrement conique, quelquefois ovalisé, présentant des côtes plus ou moins marquées hétérogènes.

Pédoncule court.

Cœur fermé dans une cuvette profonde et assez large.

Épiderme légèrement rugueux, entièrement vert mat, parfois lavé d'un rose-orangé très pâle, avec des lenticelles blanches assez grosses et quelques-unes superficielles de couleur marron.


Chair blanche, assez grossière, juteuse, sucrée, de qualité gustative moyenne à bonne selon les terrains.

René vert A276, A277



Arbre moyennement vigoureux, érigé, à ramifications mi-fermées dans son jeune âge, prenant plus tard un port ouvert très ramifié. Feuilles duveteuses sur la face inférieure. Il présente une fructification* de type II à III. Les branches fructifères ont une bourse terminale assez fréquente qui favorise la mise en place de la fructification. Les coursonnes fructifient de façon alternée les premières années. Devenant autonomes et se complexifiant en vieillissant, elles produisent fruit sur fruit, mais l'arbre nécessite un éclaircissage rigoureux pour produire régulièrement.

Résultat du test réalisé par l'INRA d'Angers par inoculation en serre de souches de races communes de tavelure sur variétés greffées sur porte-greffe vigoureux : Sensibilité marquée.



La coursonne autonome peut produire fruit sur fruit. Ici : fruit, bois, fruit, fleur (fruit).

