

Vermillon d'Espagne A298



Variété autrefois fréquente au sud-ouest du Lot-et-Garonne. Elle fut commercialisée sur les marchés de Tonneins jusqu'à Casteljaloux. Elle reste présente au sud de la Dordogne, mais est difficile à découvrir. Elle y est désignée indifféremment sous les appellations de **Vermillon** et **Merveillon d'Espagne**.

Nous avons tenté de la rapprocher de l'une des anciennes variétés du Massif pyrénéen, Petite ou Grosse Merveille, décrite dans le *Dictionnaire de pomologie* de 1873, mais elle s'avère différente.


Toutefois, il semblerait bien qu'elle corresponde à une variété-population présente autrefois dans une grande partie de la moyenne Garonne et plus au nord en Dordogne.

Origine : Dordogne, Lot-et-Garonne

Maturité : très tardive (récolte fin octobre – mi-novembre) – longue conservation qui dure jusqu'en avril

Floraison : mi-précoce avec un décalage important de deux stades, les fleurs latérales sur bois âgé de 1 an beaucoup plus tardives que celles sur rameaux plus âgés. Les bourgeons fermés sont rouge foncé et les pétales ouverts rose

Fruit de calibre petit à moyen (selon le degré d'éclaircissage), arrondi très aplati, très régulier. Pédoncule court inséré dans une cuvette étroite. Cuvette oculaire large à bord abrupt, finement côtelée, au fond de laquelle l'œil est fermé. Épiderme presque entièrement, voire totalement rouge violacé, recouvert d'une épaisse pruine blanche lui donnant un aspect mat, alors qu'une fois ciré il devient très brillant, laissant apparaître sur les zones à l'ombre le fond jaune paille. La zone la plus ensoleillée est marquée de fines stries pourpre foncé.



Alterne à la coursonne et à l'arbre, ici l'année à fruit.

Chair très blanche, croquante, moyennement sucrée et acidulée, très juteuse, assez parfumée, agréable. À la récolte, fin octobre, les fruits sont encore très acidulés.

Arbre vigoureux, à ramifications mi-fermées pendant son jeune âge, qui s'ouvrent légèrement ensuite en raison de son abondante fertilité, produisant sur tous les bois.

C'est un type I de fructification*.

Cette variété produit fréquemment de trois à quatre fruits par inflorescence ; l'année de production, celle-ci est très excessive.

L'alternance* de production à la couronne est nette. Cependant, le renouvellement chaque année de la fructification latérale sur bois âgés de 1 an et les désynchronisations du cycle des coursonnes sur quelques secteurs de l'arbre peuvent favoriser le développement de quelques fruits les années d'alternance.

Variété qui s'avère extrêmement sensible à la tavelure en conditions naturelles, sur feuillage et sur fruits, raison probable de son abandon dans les campagnes. Mais les arbres traités donnent une production extraordinairement abondante et de qualité.

Résultat du test réalisé par l'INRA d'Angers par inoculation en serre de souches de races communes de tavelure sur variétés greffées sur porte-greffe vigoureux : Résultats contrastés de sensibilité avec sporulation et de belles réactions de résistance.