

Virgouleuse, Poire de Glace, Chambrette



Variété originaire de Haute-Vienne, soit du village de Virgoulé proche de Saint-Léonard, soit de celui de Virgouleix près de Limoges, et antérieure à 1665 (date de la première description par N. de Bonnefons). Son synonyme, la Chambrette, lui viendrait du baron de Chambray, seigneur du lieu où on la découvrit.

Cette variété a longtemps été très estimée. Sa culture semble avoir été délaissée vers le milieu du XIX^e siècle pour au moins trois raisons : la mise à fruit est lente, la chute avant maturité importante, la conservation délicate. Les anciens pomologues avaient proposé des solutions pour limiter les défauts naturels de cet arbre : tout d'abord, le planter au nord ou à l'ombre pour que les fruits ne soient pas à l'insolation directe ; ensuite, isoler la récolte des planches du fruitier. En 1706, Morel proposait de couvrir le sol d'un lit de mousse ou de sable de rivière bien sec, et d'y placer les poires sans qu'elles se touchent. Trente ans plus tôt, Merlet disait dans son admirable descriptif tiré de l'*Abrégé des bons fruits* : elle est « d'un bœurré solide et extraordinaire, qui dure et se mange pendant un long temps ; elle ne veut pas estre enfermée, ny mise sur le sapin, ny la paille, non plus que les autres fruits bœurréz, qui en prennent le goût, mais bien sur le bois de chesne, ou sur le plâtre [...] il flétrit estant cueilly avant sa maturité, et il demande le buisson plutôt que le plein-vent qui le fait tomber, tenant peu à l'arbre. On en peut mettre au Espalier au Levant ou au Couchant, et jamais au midy, qui fait jaunir l'arbre et fendre le fruit qui pourrit et ne se garde pas ».

En 1948, la Virgouleuse était encore présente en Limousin et décrite parmi les quatre variétés de poires du Sud-Ouest présentées par la Société pomologique de France.

Origine : Limousin

Maturité : novembre – fin janvier

Floraison : moyenne

Fruit moyen ou gros, ovale, plus haut que large, déprimé aux deux extrémités, légèrement côtelé à l'œil, à surface un peu bosselée.

Pédoncule gros et long, légèrement arqué, un peu enfoncé dans le fruit, renflé et coloré de vert à son insertion sur le fruit. Cuvette de l'œil assez superficielle, striée en cercles, contenant un petit œil décentré par rapport à l'axe du fruit.

Épiderme lisse, vert printemps passant au jaune verdâtre à maturité, plus ou moins plaqué de points ou de raies liégeux.

Chair ferme, blanchâtre, peu granuleuse, fine, mi-fondante, très juteuse, sucrée et acidulée, parfumée, très agréable, de première qualité.


Arbre très vigoureux et érigé avec une forte dominance du tronc.

La ramification souple s'ouvre sous le poids des fruits, elle est de couleur verdâtre. Le feuillage est très vert.

Cette variété fructifie sur bois âgé de 2 ans (pas sur bois âgé de 1 an).

Alterne à la coursonne, mais il existe un désynchronisme global entre elles (on observe à la fois des coursonnes à fruit et d'autres en dards) qui permet à l'arbre de produire assez régulièrement.

Variété sensible à la tavelure, mais qui semble rester relativement indemne dans les zones de montagne.



Alterne à la coursonne, mais se désynchronise : deux coursonnes sont à bois après fructification. Les trois autres vont produire après passage par un bourgeon à bois.