

Cerise noire d'Itxassou, Geresi belxa



Arbres âgés très grands, à bois noir, de type *Prunus avium*, à feuillage caractéristique : feuilles très allongées et étroites, très dentées et à bords très ondulés.

Origine : Pays basque, Itxassou
Maturité : mi-tardive – troisième semaine de juin
Floraison : précoce à moyenne – dernière semaine de mars (24-29 mars), deuxième semaine d'avril les années tardives avec échelonnement sur deux à trois semaines

Guigne très appréciée, de petit calibre, globuleuse, parfois légèrement en forme de

cœur, aussi large que haute, à sillon et suture peu apparents, à pédoncule court à moyen qui se détache assez facilement du fruit. Épiderme résistant, de couleur noire, sans ponctuation claire.


Chair pourpre, tendre, très juteuse, à jus pourpre foncé devenant noir, à saveur équilibrée pouvant devenir extrêmement sucrée (IR 18 à plus de 30).
Petit noyau libre de forme triangulaire.



Excellente qualité gustative, utilisée en frais, confiture ou en pâtisserie.

Arbre vigoureux à port étalé. Les bouquets de mai sont longs et ressemblent à des chiffonnes courtes (cf. dessin). Ils produisent sur des bois âgés de 2 à 5 ans. Elle se différencie de Mourette par son fruit plus gros, plus noir, plus brillant et plus cordiforme, mais aussi par une sensibilité supérieure au monilia sur fruits.

Sensible également à la mouche de la cerise.



Les bouquets de mai s'allongent en vieillissant. Ici à 4 ans.

Chapata – voir Xapata

Cœur de bœuf



Origine : Bazadais
Maturité : moyenne à mi-tardive – deuxième et troisième semaines de juin
Floraison : mi-tardive – première et deuxième semaines d'avril

Très gros **bigarreau**, en forme de rein plus large que haut, irrégulier, présentant des reliefs. Sillon presque invisible et suture peu profonde de couleur plus foncée que le fruit, point pistillaire parfois en relief, pédoncule court (3,5 cm). Épiderme rouge orangé fortement ponctué de points vermillon.

Chair ferme, rouge pâle plus claire vers le noyau, à jus rouge, à saveur équilibrée en sucre (IR 19-29) et acidité.
Noyau semi-libre, sphérique, de taille moyenne par rapport au fruit.

Arbre érigé à angles fermés, multi-axes. Très peu ramifié mais très fourni en bouquets de mai allongés et trapus avec beaucoup de fleurs en manchon (cf. dessin).

Fruit peu sensible à l'éclatement et aux maladies et parasites.
Peut développer du monilia sur fruits après une forte pluie.

Érigé, peu ramifié, bouquets de mai allongés et trapus, bourgeons pointus.

