

Caillou



Origine : Gironde, Entre-deux-Mers
Maturité : tardive – seconde quinzaine de juin
Floraison : précoce à moyenne – dernière semaine de mars et première d’avril

Fruit de calibre petit à moyen, d’une très grande fermeté, presque craquant, arrondi, dissymétrique, aussi large que haut, à pédoncule assez long et rigide, sillon et suture peu profonds, point pistillaire très enfoncé.
Épiderme de couleur pourpre à noir,
Chair rouge, très dure, à jus rouge-rosé, paraissant moyennement sucrée (IR 19 à 23).
Fruit de qualité moyenne à faible.
Noyau allongé, caréné, gros par rapport au fruit, (large et long) mais assez fragile et adhérent.

Arbre moyennement vigoureux, à silhouette conique.
Débourrement précoce, très fertile, produit en grappes serrées.
Se développe sur un seul tronc, la structure est basitane à mésotone avec un port semi-dressé à fermé.
Très bonne répartition de la fructification par bouquets de mai sur des portions de rameaux âgés de 1 à 5 ans.
Tendance à la surpopulation de fruits à la jonction des portions de rameaux de 2 à 1 an.

Très résistant aux parasites.

FIN DE POPULATION

Tonkinoise




Origine : Landes
Maturité : précoce – dernière semaine de mai et première de juin
Floraison : moyenne – fin de la dernière semaine de mars et première d’avril (29 mars-6 avril)

Guigne de calibre moyen à fort (7 g), de calibre homogène, cordiforme tronquée, aplatie sur son épaisseur, sillon marqué, suture peu apparente, point pistillaire en creux bien visible.
Longueur du pédoncule très hétérogène, de court à long, légèrement adhérent au fruit.
Épiderme de couleur rouge devenant pourpre foncé.
Chair rouge pourpre, de fermeté moyenne à faible, à jus rouge pourpre abondant, de saveur sucrée (IR moyen 12,5-15), non acidulée.
Noyau semi-adhérent, assez gros.

Qualité gustative moyenne par manque d’acidité.
Se différencie du Bigarreau de Mai par sa saveur plus sucrée, sa chair plus tendre, son calibre supérieur, et sa forme plus cordiforme.
Fruit de table.

Arbre vigoureux, semi-dressé. Les branches s’ouvrent sous le poids des fruits.
Cette variété très fertile produit principalement sur bois âgé de 2 et 3 ans. Les bouquets de mai sont longs et trapus. Ils présentent un net gradient de développement entre le haut de la portion de rameau qui les porte et le bas où ils dépérissent rapidement (cf. dessin).
Tendance à la surpopulation de fruits à la jonction des portions de rameaux de 2 à 1 an.

Bonne résistance à la pluie sur l’épiderme (pas d’éclatement) mais sensible au monilia.



Bouquets de mai longs et trapus sur bois âgé de 3 ans. Net gradient acrotone.