

Bigarreau de mai



Autrefois commercialisé sur les marchés bordelais, après la cerise Saint-Fort, mais de bien meilleure qualité, malgré une teneur en sucre encore assez moyenne.

Origine : Gironde, Entre-deux-Mers

Maturité : précoce – troisième et début quatrième semaines de mai

Floraison : semi-précoce – dernière semaine de mars - première semaine d'avril

Fruit de calibre moyen, réniforme, plus large que haut, sillon et suture peu marqués, pédoncule court, produit par groupe de deux ou trois fruits réunis par leur pédoncule. Épiderme rouge-orangé devenant rouge foncé à parfaite maturité.

Chair semi-ferme, rose à jus rose foncé, à saveur équilibrée à un niveau moyen en sucre (IR max. 14 à 17) et acidité, à noyau semi-adhérent, d'assez gros calibre, dissymétrique. Qualité gustative moyenne.

Arbre vigoureux à port semi-étalé, à tendance basitane*.

Ramifications vigoureuses retombantes. Bouquets de mai nombreux et trapus vieillissant facilement (cf. dessin).

Peu sensible aux maladies et parasites. Peut développer un peu de monilia sur fruit après une pluie sur la récolte.

Bouquets de mai nombreux vieillissant facilement.



Bigarreau marbré



Variété restée localisée depuis le XIX^e siècle, période de son apparition dans la littérature, dans la région nord du Bordelais, où on la retrouve encore couramment dans les campagnes. Elle fut commercialisée sur les marchés bordelais jusqu'après 1940.

Arbre très reconnaissable dans les campagnes par sa grande vigueur et son port très ouvert, les ramifications les plus jeunes étant inclinées vers le sol. Son débourrement est plus tardif que celui des autres variétés de cette zone géographique.

Origine : Gironde, Entre-deux-Mers

Maturité : moyenne – seconde et troisième semaines de juin, échelonnée

Floraison moyenne – première semaine d'avril

Bigarreau d'assez gros calibre, réniforme aussi large que haut, à suture ventrale profonde et sillon dorsal invisible, point pistillaire aplati et pédoncule moyen à long. Épiderme rouge marbré de pourpre et strié de noir marqué de zones pointillées d'un rouge plus foncé presque noir en taches de léopard. La caractéristique de cette marbrure est de ne pas être commune dans cette espèce, c'est-à-dire non pas rouge sur fond clair, mais bien noir sur fond rouge. Le pédoncule est assez long, la cuvette

Port retombant, ramification grêle, bouquets de mai tassés.

