

pédonculaire large et profonde.
Chair ferme, blanc crème rosée à jus incolore à rose, moyennement juteuse, moyennement sucrée (IR 15,5-16) et légèrement acidulée.

Le noyau est assez gros, allongé.
Arbre vigoureux, multi-axes dressés, à port retombant. La ramification est assez grêle. Les bouquets de mai tassés et courts sont aussi larges que hauts (cf. dessin).

Ils s'éteignent (voir extinction*) sur les branches retombantes mais vieillissent bien sur les branches restant érigées.

Peu sensible aux parasites sauf monilia sur fruit après une pluie sur la récolte.

Blancale précoce



Origine : Lot-et-Garonne, nord Agenais
Maturité : précoce – dernière semaine de mai et début première semaine de juin
Floraison : précoce – dernière semaine de mars

Fruit de calibre assez gros, réniforme pointu, aplati sur l'épaisseur, plus large que haut, à sillon peu profond et suture présente marquée par une coloration orangée, à pédoncule de longueur variable parfois très long (4 à 6 cm). Épiderme jaune rosé se colorant de vermillon pointillé à l'insolation, présentant une fragilité à la pluie qui provoque des éclatements en cercle autour de la cuvette pédonculaire et du point

pistillaire jusque parfois au milieu du fruit.
Chair tendre, blanc crème, à jus incolore, sucrée (IR 13-15).
Noyau libre, arrondi, de taille moyenne. Bonne qualité gustative, fruit à consommer en frais.

Arbre de vigueur moyenne, érigé à tendance basitone*, multi-axes.
Ses niveaux de croissance sont très fortement



marqués avec le développement chaque année de verticilles vigoureux. Les bouquets de mai sont petits (cf. dessin).

Peu sensible aux parasites sauf monilia sur fruit après une pluie sur la récolte.



Brindilles courtes, bouquets de mai petits.

Cerise fraise



Origine : Village de Guimps, Charente, découverte par Patrick Parade, association La mémoire fruitière des Charentes
Maturité : dernière semaine de mai
Floraison : tardive – deuxième semaine d'avril

Fruit petit à très petit, très allongé (2 cm de longueur sur 1,5 de large), à relief bombé sur la face ventrale, sillon et suture non apparents, à point pistillaire en creux et pédoncule de longueur moyenne. Épiderme vermillon sur fond jaune devenant entièrement vermillon clair, très fortement ponctué.

Chair assez tendre, blanc crème, se colorant de jaune plus foncé autour du noyau, à jus incolore, moyennement abondant, très sucrée (IR 19 à 22), de bonne qualité gustative. Noyau adhérent, très allongé (longueur du noyau 1,3 cm).
Arbre semi-dressé à dressé, à ramification acrotone et à port retombant. Tendance à se développer sur un seul tronc (à axe dominant). Ramification latérale mésotone à acrotone.