

Chair molle, crème à jaune-orangé, à jus abondant, incolore, acide. Taux de sucre faible mais évoluant fortement avec la maturité (IR 12 à 16,5).
Cerise de bonne qualité.



Petit noyau libre, lisse, présentant un développement caréné d'un côté.

Arbre très fertile, fructifie sur verticilles et sur brindilles sur toute la longueur du rameau mais plus particulièrement sur les portions de 1 et 2 ans.

Multi-axes très ramifié, plus érigé que Griotte de Moissac.

La ramification est fine et souple.

Sensible au monilia sur fruit.

Peu sensible à la mouche de la cerise.



Griotte de Moissac



Origine : Tarn-et-Garonne, région de Moissac, encore multiplié actuellement

Maturité : très tardive – troisième semaine de juin à première semaine de juillet

Floraison : très tardive (11-15 avril) qui se poursuit comme Montmorency au-delà du 20 avril

Cerise rouge, très juteuse, à confiture, de caractéristique identique à Griotte de Montmorency sauf jus jaune rosé et taux de sucre supérieur (13, 5 à 17,5).




Arbre très ramifié, à port retombant « faisant la boule » : la fructification par bouquet de mai couronne l'ensemble des pousses en haut et sur la périphérie de l'arbre, ce qui lui donne un aspect en forme de boule.

Les bouquets de mai fonctionnent essentiellement sur bois âgé de 2 ans. Dès 3 ans ils dépérissent, surtout si la branche n'est pas vigoureuse (cf. dessin). L'ensemble de la ramification est grêle et se dénude fortement. Les bourgeons floraux sont ronds.

Sensible au monilia sur fruit.

Peu sensible à la mouche de la cerise.



Fructifie sur bouquets de mai et brindilles. Extinction des bouquets de mai dès l'âge de 3 ans.