

Granjaude



Origine : Corrèze
Maturité : tardive – dernière semaine de juin
Floraison : tardive – deuxième et troisième semaines d'avril pouvant atteindre fin avril

Cerise de petite taille, de forme arrondie légèrement allongée, aux sillon et suture peu marqués.
Épiderme de couleur rouge-noir vif fortement ponctué de pigments clairs, à pédoncule court à moyen.
Chair ferme, jaune-orangé, très juteuse, à jus rose, sucré (IR 20-23).
Noyau pointu, de grande taille par rapport au fruit, très légèrement adhérent, mais qui se dénoyaute facilement.
Arbre très vigoureux, très érigé, à croissance rapide. Les branches cassées cicatrisent très bien et la repousse est rapide. Arbre à tendance multi-axe.
Ramifications mésotones. Aspect dénudé.
Variété d'une grande fertilité ayant tendance à alterner sa production.
Les bouquets de mai peuvent s'empiler sur plus de 10 années s'ils sont bien éclairés.

Très peu sensible à la gommose.
Sensible au corynéum.
Très sensible au monilia sur fruit après une pluie sur la récolte.
Sensible à la mouche de la cerise.



Mourette, Amourette, Mourique



Encore appelée Guigne noire petite, cette variété était très répandue et reste présente, dans les Landes, en Gironde et en Lot-et-Garonne, sous le nom de Mourette, et en Béarn sous le nom de Mourique, clone à floraison plus tardive. On retrouve ces deux appellations dans les Landes, qui

proviendraient de la teinte très noire de son jus qui tache la peau et le linge.
Elle était recherchée pour faire des confitures auxquelles elle donne une belle couleur pourpre. Elle est citée dans *Le cuisinier landais* à ce titre, ainsi que pour la fabrication d'une liqueur autrefois estimée, le marasquin, et pour la confection des clafoutis.

Origine : Béarn, Landes et Gironde
Maturité : mi-tardive – fin deuxième et troisième semaines de juin
Floraison : mi-tardive – première et deuxième semaines d'avril (un clone béarnais plus tardif, fin de seconde semaine d'avril)

Guigne de très petit calibre, cordiforme, plus large que haut, à sillon et suture à peine visibles, point pistillaire en creux, cavité pédonculaire peu profonde, pédoncule long (supérieur à 6 cm), très adhérent à la chair. Peau noire, pulpe et jus très foncés, laissant des traces violettes.
Chair fondante, très juteuse, très sucrée (IR supérieur à 20 pouvant atteindre 27), sans acidité.
Noyau semi-adhérent, de taille assez grande par rapport à la taille du fruit.
Arbre très fertile, érigé, de vigueur moyenne. Peu ramifié, à rameaux inclinés vers le bas. Les bouquets de mai âgés de 2 à 6 ans sont nombreux et peuvent vieillir davantage. On assiste alors à des empilements de pousses courtes (cf. dessin).

Feuilles aussi larges que longues, de petite taille.

Variété très résistante aux maladies et parasites, y compris à la mouche de la cerise.



Les bouquets de mai vieillissent bien, 5 empilements successifs de pousses courtes.