


Peloa



Variété très multipliée dans le village d'Itxassou depuis le début du xx^e siècle, originaire de Cambo-les-Bains, mais peut-être importée d'Angleterre. Le village recèle deux types de clones de précocité différente, un plus précoce dont la maturité commence vers le 22-23 mai alors que celle des autres se situe vers le 26-30 mai. Cette variété est celle qui mûrit le plus précocement parmi la population de variétés de cerisiers cultivées à Itxassou. Ses feuilles sont longues, le clone le plus précoce les ayant plus allongées encore.

Origine : Pays basque, Itxassou
Maturité : précoce – fin mai, première semaine de juin pour la plupart des clones. Le clone précoce Co39 mûrit troisième et début quatrième semaines de mai
Floraison : précoce (24-31 mars pour les clones de floraison précoce) à moyenne (28 mars - 4 avril pour les clones plus tardifs)

Guigne de calibre moyen à assez gros (6 à 6,5 g), réniforme arrondie, présentant deux dépressions (un sillon dorsal et une suture ventrale marqués), lui donnant un aspect aplati sur son épaisseur, avec un point pistillaire en creux, une cuvette pédonculaire large et profonde, et un pédoncule assez long. Épiderme fin, de couleur pourpre à noir brillant, sans ponctuation, devenant très foncé à maturité complète. **Chair** molle et fondante, de couleur pourpre à jus très foncé rouge pourpre, très abondant, sucrée (IR 13,5 - 15,5) et très légèrement acidulée. Noyau faiblement adhérent, de petit calibre.



Ramifications très ouvertes, bouquets de mai réguliers, pas ou peu de brindilles.