

POPULATION DES BIGARREUX BLANC DUR, TROMPE-GEAI, TROMPE PIE

Bigarreau blanc dur, Trompe-geai, Trompe-pie



C088

Variété-population classique dans la région, plus particulièrement fréquente dans les Landes, riche de différents clones aux comportements légèrement différents qui se caractérisent par des arbres vigoureux, bien résistants aux grands froids hivernaux, très érigés, à bois très foncé, avec une densité de rameaux moyenne, des bourgeons vert pâle et un feuillage plus clair que les autres cerisiers portant des nectaires exclusivement jaunes, ainsi qu'une floraison assez tardive et une faible sensibilité aux maladies (en particulier bactérioses et monilia de printemps).

Origine : Aquitaine
Maturité : mi-tardive – troisième semaine de juin
Floraison : tardive – deuxième semaine d'avril (10-11 avril) sauf le clone 43 à floraison toujours moins tardive (6-8 avril)

Bigarreau généralement moyen à assez gros selon les clones, en forme de rein aussi large que haut, aplati sur l'épaisseur, présentant un sillon profond, une suture ventrale marquée et colorée de jaune plus intense, et un point pistillaire aplati ou légèrement en relief, marron devenant noir, à cuvette pédonculaire assez large, à pédoncule de longueur moyenne parfois élevée, fortement adhérent à son support.
Épiderme de couleur uniformément jaune sans aucune couleur superficielle ni ponctuation apparente, transparent, laissant apparaître des veinures internes qui s'oxydent et se ternissent de marron lorsque le fruit atteint la surmaturité. Les manipulations et le transport sont difficiles en raison de cette fragilité de coloration de l'épiderme.

Chair moyennement ferme à croquante selon les clones et l'évolution de la maturité, blanc crème à jaune, très parfumée, à jus incolore moyennement abondant, à saveur sucrée, possédant une légère amertume caractéristique et agréable.
Noyau de taille moyenne légèrement adhérent.
Utilisation en frais ou au sirop.

Les clones les plus distincts de la région :

- **Clone C030** : épiderme jaune, taux de sucre moyen (IR 19 à 21,5).
- **Clone C043** : épiderme jaune, taux de sucre moyen (IR 19).
- **Clone C050** : épiderme doré, noyau moyen, taux de sucre moyen (IR 17 à 22).
- **Clone C057** : épiderme jaune, face dorsale très bombée recourbée vers l'avant avec le point pistillaire en extrémité, noyau moyen, taux de sucre moyen (IR 17 à 21).
- **Clone C077** : épiderme doré rosé à rose orangé à l'insolation, noyau sphérique plus gros, maturité plus précoce, nettement plus sucré (IR 18 à 26).

Arbre : Le caractère multi-axial des différents clones de cette famille est renforcé par une grande vigueur et un port érigé.
Autre particularité : des ramifications sous la zone distale* au milieu de la portion annuelle du rameau.
De nombreux bouquets de mai courts sont présents sur ces rameaux (cf. dessin).



C050



C056



C057