

LA POPULATION DES ANGEVINES

Angevine de Marmande, Angevine de Buzet et Angevine rouge, originaires du Lot-et-Garonne, sont trois variétés très proches les unes des autres qui ont été décrites dans la pomologie publiée en 1950 par l'INRA de Bordeaux. Elles portent comme synonyme Madeleine.

La pomologie de l'INRA décrit l'Angevine de Marmande comme étant la plus précoce (fin juillet-début août). Le décalage de maturité par rapport à cette dernière est de quatre jours pour l'Angevine de Buzet et de cinq jours pour l'Angevine rouge. Les dates de maturité de la pomologie doivent, bien entendu, être revues de deux semaines par rapport à notre époque.

Fruit assez gros, à épiderme très coloré de rouge foncé noirâtre sur un fond jaune-orangé ou rouge-orangé.

Chair jaune à jaune-orangé légèrement colorée de rouge sous l'épiderme. Noyau libre, à texture tendre, assez juteuse.

Fruit d'excellente saveur, bien sucré, très parfumé, de très bonne présentation.

L'arbre dans ces variétés est d'assez grande vigueur et de productivité relativement bonne, présentant une très bonne résistance au monilia, une bonne résistance au corynéum et à la cloque, mais un mauvais comportement aux gelées tardives.

L'Angevine de Marmande et l'Angevine de Buzet figurent encore dans les collections du Conservatoire botanique de Porquerolles, et le clone INRA 4603 d'Angevine de Marmande dans celles du Conservatoire d'Aquitaine. L'Angevine Rouge n'a pas été retrouvée.

Angevine Clone INRA 4603

Origine : Lot-et-Garonne
Maturité : dernière semaine de juillet
Floraison : fleur campanulée

Pêche de calibre moyen, arrondie, symétrique, présentant une suture ventrale moyennement marquée, à cavité pédonculaire très profonde et très large.

Épiderme d'épaisseur moyenne, faiblement pubescent, adhérent à la chair, orangé, coloré sur plus de la moitié du fruit de pourpre foncé.

Chair jaune à jaune-orangé, colorée de rouge autour du noyau, non fibreuse, peu juteuse, très sucrée, peu acidulée, sans astringence, de très bonne qualité.


Noyau libre, allongé, de taille moyenne par rapport au fruit, marron foncé violacé, profondément sculpté, à arête ventrale très développée.

Arbre à port ouvert.
Sa ramification est importante, ouverte et bien répartie (mésotone).
Cette variété produit sur tous les sites de

fructification, et plus particulièrement sur chiffonnes et bouquets de mai.

Arbre très fleuri, les nœuds portent souvent deux fleurs.

Variété faiblement sensible à la cloque et moyennement au monilia.



FIN DE POPULATION

Blanche téton

Origine : Dordogne
Maturité : mi-tardive – quatrième semaine d'août et première de septembre
Floraison : moyenne (19 mars), fleur campanulée

Pêche allongée présentant un mucron important, à suture ventrale moyennement marquée et une cuvette pédonculaire très large.

Épiderme épais, très pubescent, blanc, recouvert aux trois quarts de rouge pour certains fruits bien éclairés.

Chair blanche, non fibreuse, juteuse, très fondante, acidulée et astringente.

Noyau libre, allongé, foncé.






Arbre de ramification acrotone, érigé durant les premières années puis retombant. Très fructifère, il s'ouvre sous le poids des fruits.

La fructification se situe sur des bouquets de mai et surtout des chiffonnes courtes. Les pédoncules des fruits de la récolte

précédente restent accrochés à leur support.

Variété légèrement sensible à la cloque et au monilia.



Port retombant.
Chiffonnes courtes. Les
pédoncules des pêches
de la récolte précédente
peuvent rester accrochés.

LA POPULATION DES BRUGNONS ET NECTARINES

Les brugnons et nectarines sont des fruits à peau lisse restés moins fréquents dans les populations locales que les fruits à peau duveteuse. Dans le Sud-Ouest, ils portent l'appellation unique de brugnon avec pour substantifs brugnon mâle et brugnon femelle pour les nectarines, dont le noyau est libre ou semi-adhérent.

Ils s'avèrent globalement plus fragiles, surtout au moment de la récolte où la sensibilité à la dégradation du fruit et au monilia est fréquente après une forte pluie.

Brugnon blanc ou Brugnon jaune



C064

Origine : Lot-et-Garonne – Dordogne,
Maturité : fin de deuxième et début troisième semaines d'août
Floraison : mi-tardive (19-22 mars), fleur campanulée

Épiderme lisse, presque cireux, jaune pâle nacré presque blanc sans coloration superficielle, sauf parfois quelques rares stries rose-orangé.

Chair jaune très pâle, très dense, très ferme, sucrée, très parfumée, peu acidulée. Noyau très adhérent.

Fruit qui reste dur à maturité et qui chute rapidement s'il n'est pas cueilli à temps.

Arbre moyennement vigoureux, très fertile, à feuillage très pâle, semi-dressé à dressé, bien ramifié.

Sa ramification est grêle et filiforme. Cette variété produit sur chiffonnes et rameaux mixtes.

Ses fleurs sont souvent doubles.



C064