

Marguerite-Marillat



Origine : nationale ancienne, 1870

Maturité : mi-août – mi-septembre

Floraison : mi-précoce à moyenne – échelonnée

Fruit gros à très gros, piriforme fortement élargi au pôle oculaire, très dissymétrique avec un côté plus ventru, côtelé au pôle pédonculaire. Présente souvent des fruits de forme très différente sur le même arbre.

Pédoncule moyen, trapu, court, parfois très arqué à l'horizontale, inséré sous un renflement du fruit. Cuvette oculaire profonde, arrondie, finement côtelée, liégeuse.

Épiderme jaune maculé de rouge brique à l'insolation, avec du liège plus ou moins étendu, lenticelles marron très nombreuses.

Chair blanc jaunâtre à faisceaux jaunes,

fondante, très juteuse, légèrement granuleuse autour du cœur, sucrée, peu acidulée, de bonne qualité.

Arbre trapu au niveau du bois et des bourses. Ramifications bloquées tôt par une forte fructification terminale.

Pas de bourse sur bourse : alternance à la coursonne.

Importante extinction de coursonnes à 2 ou 3 ans d'âge.

Sans doute en raison d'une très forte extinction des coursonnes et d'un blocage terminal spectaculaire des branches fruitières, cette variété qui alterne à la coursonne peut produire régulièrement.

Présente souvent un seul fruit par inflorescence.

Variété assez sensible à la tavelure sur feuilles.



Blocage spectaculaire
du bourgeon terminal.