

Poire Curé, Belle de Berry, Poire de Curé, Bon Papa



Cette variété de poirier, découverte en 1760 aux environs de Clion dans l'Indre, est encore appelée **Belle de Berry**, ou **Poire de Curé**, voire **Bon Papa** en Corrèze.

Cette variété s'est diffusée dans l'ensemble du Sud-Ouest, probablement assez rapidement et d'une manière uniforme. Des arbres très volumineux sont présents un peu partout, que ce soit en Ariège, en Haute-Garonne ou en Limousin.

Sa diffusion de longue date à grande échelle a donné lieu à la création de nombreux clones. Elle est souvent dénommée **La Curé** ou **Curé**.

Origine : originaire de Clion dans l'Indre vers 1760, présente dans tout le Sud-Ouest

Maturité : novembre – janvier

Floraison : précoce, étamines très rouges et longues qui dépassent en dehors de la corolle

Débournement : précoce

Fruit moyen à gros selon le clone, très allongé, renflé à la base et très étranglé en zone pédonculaire.

Pédoncule assez long, fort, légèrement arqué, renflé à l'extrémité, posé à fleur de fruit ou encore à la base d'un renflement incliné. Œil très ouvert à grands sépales, inséré dans une cuvette peu profonde, large et ondulée.

Épiderme lisse, épais, vert à vert-gris selon les clones, parfois coloré de rouge bronzé à l'insolation. La plupart des récoltes comptent un certain nombre de fruits présentant une raie de liège marron, longitudinale, bien marquée et continue, sorte de couture reliant le pédoncule à l'œil. Ce caractère n'est pas constant, et selon les clones, le nombre de fruits rayés est plus ou moins important.

Chair blanche, assez granuleuse, assez juteuse, mais de qualité médiocre crue. En revanche,

elle devient très bonne une fois cuite.

La Poire Curé a aussi souvent été séchée dans les campagnes.

Arbre de vigueur importante à port pleureur.


Sa ramification très acrotone ploie sous le poids des fruits car cette variété a une fertilité élevée.

La plupart des coursonnes latérales alternent, mais la variété est désynchronisée : celles en position terminale produisent fruit sur fruit avec des brindilles couronnées assez grêles et, de fait, prennent le relais les années où les coursonnes courtes alternent.

Ainsi, l'arbre de Poire Curé n'alterne pas, mais un bon éclaircissage des fruits les années de forte charge l'aidera à maintenir cette régularité fructifère.

Fruits parfois solitaires, souvent groupés par deux ou trois.

Variété assez sensible à la tavelure sur son feuillage, ses fruits et son bois.



Très acrotone. Retour à fruit sur brindilles couronnées en terminal. Pas ou peu de pousses de bourses courtes.