

LES POIRES DE TABLE OU À DEUX FINS


Baumette



Origine : Landes
Maturité : première quinzaine d'août
Floraison : très précoce
Débourrement : très précoce

Fruit de petit calibre, arrondi légèrement conique en zone pédonculaire.
Pédoncule très long, fin, marron-roux. Œil ouvert.
Cuvettes pédonculaire et oculaire superficielles.
Épiderme vert mat strié de pourpre clair à

l'insolation, lenticelles très grosses et nombreuses, claires ou vert foncé.
Arbre spur très trapu.
L'angle d'insertion de ses ramifications est fermé.
Sa floraison est très importante sur jeunes rameaux âgés de 1 an.
Alterne à la coursonne (ne fait pas fruit sur fruit).
Mais en raison d'une forte extinction sur bourse dès la troisième année (Cf. dessin), l'arbre peut produire régulièrement, les jeunes rameaux de 1 an apportant un nombre suffisant de fleurs chaque année.
Ce mode de fructification nécessite une taille d'élagage des jeunes rameaux afin de contrôler l'importance de la floraison.



Ci-dessus : extinction spectaculaire après fructification
Ci-contre : fructification sur bois de 1 an



Blanquet, Poire Blanquette



Une étude phénologique fut réalisée par la Société d'agriculture de la Haute-Garonne en 1820. Dans l'arrondissement de Toulouse, un poirier **Blanquette** fut observé, et dans celui de Saint-Gaudens, un poirier **Gros Blanquet**. Tous deux fleurirent le 3 avril et mûrirent vers le 15 juillet. Une autre étude menée en 1922 signale qu'au même endroit, le Gros Blanquet fleurit et mûrit deux semaines plus tôt qu'en 1820. Ces décalages de végétation, liés à la précocité du printemps, ne sont pas rares.

Origine : Sud-Ouest
Maturité : mi-juillet – août
Floraison : très précoce, échelonnée
Débourrement des feuilles très précoces, en même temps que la floraison.

Fruit : les « Blanquettes » forment une population de fruits caractérisés par leur calibre, petit à moyen, leur couleur très pâle, et leur forme variable : ronde, ovale ou encore allongée.
Épiderme de coloris blanc doré, à peau très fine.


Chair cassante, juteuse, parfumée.
Faible conservation ou conservation courte.
Bonne pour le couteau autant que pour la transformation, autrefois recherchée par les confiseurs.



Le fruit du clone retrouvé en Gironde est à coloris blanc doré caractéristique, maculé de pourpre rosé légèrement strié à insolation, conique allongé, finement côtelé à l'œil. Pédoncule moyen, courbe, de couleur vert pâle. Œil inséré à fleur de fruit, ouvert, à longs sépales noirs.



L'arbre présente un port très particulier et spectaculaire. C'est un hyper-spur. Son bois très trapu, de gros calibre, est de teinte marron clair. Les bourgeons floraux sont très gros. Ses énormes coursonnes autonomes vieillissent très bien ; elles s'empilent sur des bois âgés de 3 à 5 ans ou plus. En raison d'un désynchronisme important de la floraison sur ces énormes coursonnes, la production peut être régulière avec un bon éclaircissage des fruits.



Énormes coursonnes vieillissant très bien.

Boutoc, Poire d'ange ou Notre-Dame




Fruit de calibre petit à moyen, proche de l'Épine d'été, piriforme à conique, légèrement plus haut que large. Pédoncule long, fin, droit, de couleur roux foncé. Œil petit, à sépales cassants, généralement à fleur de fruit. **Épiderme** d'un vert jaunâtre parsemé de points gris, maculé de vermillon à rouge brique à l'insolation. **Chair** blanche, fine, tendre, fondante, très juteuse, sucrée, agréablement parfumée d'un léger goût anisé. Fruit de première qualité : délicieuse poire de table, de première qualité pour les conserves

et la compote, anciennement recherchée par les confiseurs bordelais. **Arbre** à port semi-dressé à ouvert. Très fertile. Les terminaisons des branches fructifères sont bloquées par la fructification. Les coursonnes courtes sont toutes alternantes, mais les pousses de bourses longues (brindilles couronnées) n'alternent pas. De ce fait, l'arbre produit régulièrement.

Variété très peu sensible à la tavelure.

C'est l'une des plus anciennes variétés, dénommée primitivement **Poire d'ange** puis **Poire de Notre-Dame** dès le XVI^e siècle. Cette variété, répandue en Gironde, fut appelée **Boutoc** en 1860, par Limon d'Airole. On la trouve aussi sous le synonyme de **Petite Mouille-Bouche**. Il existait alors des arbres énormes et très anciens, repérés au lieu-dit Boutoc près de Barsac. On en trouvait aussi dans la région de Bazas.

Origine : Gironde
Maturité : pouvant s'étaler du 15 août au 15 septembre
Floraison : mi-tardive, caractérisée par des pétales roses



Coursonnes alternantes, mais les rameaux sont bloqués par la fructification et la production est régulière.

