

Coutras, Coutras des Pyrénées, Couteras A090



Bien qu'assez homogène, Coutras forme une population, due à sa multiplication traditionnelle par semis. Ce mode de multiplication n'a toutefois pas fait apparaître de grandes variations de types. L'un d'entre eux est toutefois un peu plus spur*. Très fréquente dans le Massif pyrénéen, elle a fait l'objet au XIX^e siècle d'un commerce assez important sur les marchés toulousains. Elle y était aussi commune que la De l'Estre, en raison de leur très longue conservation, Coutras et De l'Estre étaient les dernières pommes à apparaître sur les marchés de cette région.

Traditionnellement les Coutras étaient conservées en tas, parfois jusqu'au 15 août. Cette population a été utilisée comme pomme à couteau, pomme à cidre, et même comme porte-greffe de grande vigueur. Coutras était réputée pour bien supporter le transport ; il semble que certains clones soient plus fragiles que d'autres.

Origine : Hautes-Pyrénées, Tarn-et-Garonne, Ariège, Pyrénées-Atlantiques

Maturité : tardive (décembre), récolte dernière quinzaine d'octobre, de très longue conservation (mai)

Floraison : mi-précoce à précoce

Fruit de calibre moyen, arrondi quelquefois aplati, légèrement côtelé. Pédoncule court.

Œil petit, fermé dans une cuvette peu profonde évasée, plissée.

Épiderme vert soutenu s'éclaircissant en se conservant, devenant presque translucide, lavé de rose vif à l'insolation.

Chair jaunâtre, craquante, sucrée, légèrement acidulée, assez parfumée.


Pomme à couteau et à cidre.

Arbre peu vigoureux, très trapu, assez basitone, à ramification ouverte qui fléchit assez facilement sous le poids des fruits. Fructification* de type II à III. Alterne à la coursonne mais semble se désynchroniser assez facilement. Extinction* naturelle des bourses et des bourgeons sur rameaux de 2 ans à partir de la floraison, ce qui entraîne une dénudation du centre de l'arbre.

Coutras peut produire régulièrement, aidée par l'éclaircissage des fruits.

Variété rustique.

Résultat du test réalisé par l'INRA d'Angers par inoculation en serre de souches de races communes de tavelure sur variétés greffées sur porte-greffe vigoureux : Résistance polygénique qui, malgré des résultats contrastés, présente un niveau de sporulation faible.



Population présentant une possible régularité de production.