

Gordain Xurria (se prononce churia), Gordinxuria, Gordain Sagarra A442



Gordain Xurria a été décrite comme une pomme d'hiver de longue conservation, alors que celle que l'on trouve en Pays basque sous ce nom depuis l'après-guerre est mi-précoce.

Maturité : moyenne, 15 septembre (récolte fin août, début septembre) – conservation octobre

Floraison : Tardive, deuxième décennie d'avril. Ses gros corymbes blanc rose pâle sont parfumés

Débourrement : tardif

Fruit de calibre moyen, arrondi, jaune verdâtre pâle, presque blanc (Xurria).

Chair blanche, à texture fine, peu parfumée. À couteau et à cidre.

Analyse des jus : moyennement juteuse, acidulée, moyennement sucrée, sans amertume.

Arbre de vigueur moyenne, à port ouvert, à ramifications longues et dégarnies, très fertile, produisant sur bois jeune, à forte tendance à l'alternance*.

C'est un type IV de fructification*, acrotone*, bien ramifié, à bois souple, et feuillage clair. La dénudation de la base des branches fruitières est importante. Les rameaux âgés de 1 an portent des fleurs latéralement. Malgré une bourse terminale forte (et très allongée) et une extinction* naturelle de bourgeons importante provoquant un allongement des coursonnes, ces dernières alternent. Cette variété semble ne pouvoir produire qu'un an sur deux.

Variété rustique, assez peu sensible aux parasites.

Résultat du test réalisé par l'INRA d'Angers par inoculation en serre de souches de races communes de tavelure sur variétés greffées sur porte-greffe vigoureux : Sensible.



Coursonnes en année d'alternance.

Jinko Sagarra, Jinkoa (Pomme Dieu) A351



Variété dont le nom signifie « pomme dieu », mais qui n'a pas de parenté avec la Pomme Dieu girondine. L'étude réalisée par l'INRA de Bordeaux entre 1959 et 1961 avait conclu en une très belle présentation du fruit et une remarquable aptitude à la conservation.

Maturité : très tardive (décembre) – (récolte début novembre) – conservation mai – juin

Floraison : mi-tardive à moyenne, échelonnée. Ses gros corymbes, éloignés les uns des autres, ont une couleur blanc nacré bordée de rose.

Fruit de très belle présentation, de calibre élevé, globuleux aplati, régulier. Épiderme lisse, devenant cireux à la conservation, de couleur jaune pâle maculé à



l'insolation de rose pointillé, sur un quart de la surface, largement couvert de liège clair en zone pédonculaire.

Œil fermé dans une cuvette large et moyennement profonde, mamelonnée.

Pédoncule très court enfoncé dans une cuvette profonde et étroite, évasée au bord très lisse.

Chair très blanche, croquante, assez grossière, douce, juteuse.

Analyse des jus : moyennement juteuse, acidulée, moyennement sucrée, à faible amertume.

Arbre vigoureux, d'un port acrotone* très érigé, peu ramifié sur l'axe, à ramifications fermées, dégarnies à la base, verticillé puis retombant. Jinkoa Sagarra a un type III de fructification*, à réitérations* prédominantes ; à mise à fruit lente, il devient ensuite très fertile.

Les coursonnes, devenues autonomes en vieillissant, alternent. Mais le retour à fruit est assuré par des brindilles couronnées et par de jeunes rameaux qui se renouvellent chaque année et, à l'âge de 2 ans, se mettent à fruit. Ce retour à fruit peut être conforté par un éclaircissage manuel des fruits.

Variété rustique, très peu sensible aux parasites. Résultat du test réalisé par l'INRA d'Angers par inoculation en serre de souches de races communes de tavelure sur variétés greffées sur porte-greffe vigoureux : Résistance polygénique avec faibles spots de sporulation.



Négus Sagarra A362



Son appellation signifie « variété d'hiver ».

Maturité : tardive (récolte fin octobre, début novembre) – longue conservation

Floraison : moyenne à mi-précoce, échelonnée entre les fleurs sur ramifications âgées et celles positionnées sur bois de 1 an. Les pétales de boutons fermés sont très rouges et deviennent rose foncé à l'ouverture

Fruit de calibre moyen, arrondi aplati. Pédoncule très court, enfoncé dans une cuvette profonde et large. Œil fermé dans une cuvette assez profonde, de la largeur de l'œil à bords verticaux. Épiderme lisse, entièrement rouge foncé avec de fines lenticelles blanches. Analyse des jus : moyennement juteuse, acidulée, moyennement sucrée, amère.

Arbre faible à ramifications assez peu nombreuses, ouvertes, à type III de fructification*. Les réitérations* mettent à fruit rapidement. Les coursonnes produisent trois fruits par inflorescence.

