

Azérolé A038



Clone découvert en Gironde par l'INRA de Bordeaux dans les années 1950

Origine : Blaye, Gironde
Maturité : octobre-novembre, (récolte dernière semaine de septembre), conservation moyenne (pouvant atteindre février)
Floraison : mi-précoce, bouton fermé rose pâle, fleur ouverte petite et blanche
Débourrement : précoce

Fruit de calibre moyen globuleux aplati.
Épiderme à fond vert maculé sur la quasi-totalité de rouge brique.
Œil fermé, pubescent dans cuvette arrondie moyennement profonde et large.
Pédoncule court, à fleur de fruit dans cuvette peu profonde et assez étroite.
Chair assez grossière, juteuse et parfumée.
Arbre moyennement vigoureux, de type III de fructification* à port retombant et très ramifié. Sa production de fruits est régulière, même sans éclaircissage, en raison d'une bonne autonomie de ses coursonnes. Production faible d'un nombre de fruits par inflorescence.

Fréquemment, les coursonnes courtes sont capables de produire fruit sur fruit si leur pousse de bourse est longue (brindilles couronnées).

Variété moyennement sensible à la tavelure sur feuilles, indemne sur fruit moyennement sensible aux pucerons cendrés.



POPULATION DES « BELLE-FILLE »

Variété encore très cultivée et commercialisée dans les années 1940 dans le nord de la Haute-Vienne, la Creuse, ainsi que dans une partie de l'Indre, la Belle-Fille a donné naissance à une population variétale dont l'ensemble des clones n'a pas encore été comparé. Un clone rouge,

Hollande rouge, a été développé en Haute-Vienne. Un très grand nombre d'appellations lui ont été données. C'est une des variétés les plus tardives en floraison et débourrement.

Belle-Fille, Hollande, Hollande de l'Indre, Belle-Fille de la Creuse ou Fleuri-tard, Belle-Fille de Sainte-Feyre, Belle-Fille de l'Indre, Pilette



Maturité : tardive, récolte fin octobre, début de maturité novembre, longue conservation jusqu'en mai

Floraison et débourrement : parmi les plus tardifs, première décade de mai. Fleurs très rouges

Fruit de calibre moyen, cylindrique aplati avec une légère conicité au pôle oculaire, légèrement dissymétrique.
Épiderme présentant de larges côtes, lisse, de couleur rouge rosé tendre finement strié, sur fond jaune ivoire dont l'intensité diminue vers le pôle pédonculaire.
Pédoncule court à moyen, assez gros inséré dans une cuvette pédonculaire profonde et étroite recouvert d'un liège fin.
Œil petit, fermé dans une cuvette oculaire profonde, large, plissée et légèrement mamelonnée.
Chair blanche ou blanc jaunâtre, croquante, juteuse, très sucrée, légèrement acidulée, parfumée, de bonne qualité et de bel aspect. Variété qui peut être utilisée pour améliorer les jus.

