

LES GRANDES VARIÉTÉS TRADITIONNELLES « EXPORTÉES »

(anciennes variétés commerciales produites dans plusieurs départements contigus)

POPULATION DES « AZÉROLI »

Variété-population très fréquente et cultivée commercialement jusque dans les années 1960 dans le nord du département de la Gironde et le sud de la Charente où elle porte le synonyme de **Mazoréli**, quelquefois **Mazérol**. Cette population est caractérisée par son développement relativement faible avec cependant un feuillage abondant, très sain, vert foncé brillant

remarquable. Trois clones ont été collectionnés au cours du xx^e siècle, tous trois communs au sud de la Charente et au nord de la Gironde : un premier originaire de Bègles dénommé **Azérol**, un second originaire de Bazas dénommé **Anis rose** et un troisième originaire de Cagnac dénommé **Fenouillet**.

Azérol anisé, Anis rose, Mazoréli A037



Origine : Nord-Gironde, Sud-Charente
Maturité : octobre – novembre, récolte dernière semaine de septembre, conservation moyenne (pouvant atteindre fin février)
Floraison : tardive, fin avril. Au stade bouton fermé, les fleurs sont rouge vif

Fruit de calibre moyen, de forme régulière semi-élevée tronconique, très régulier, à pédoncule très court. La cuvette oculaire est de taille moyenne, peu profonde, de forme évasée à intérieur plat.
Épiderme légèrement rugueux, à fond jaune apparaissant très légèrement sous le liège marron clair, maculé et moucheté de rose cuivré devenant parfois pourpre à forte insolation. Avant maturité, le fond de la cuvette oculaire reste longtemps de couleur verte.
Chair jaunâtre, assez ferme, et généralement à texture assez grossière, moyennement à peu juteuse, très douce, très sucrée. Elle devient plus ou moins rapidement farineuse.
Arbre moyennement vigoureux, trapu, de type II à III de fructification*, à fortes structures à angles ouverts formant de nombreuses

brindilles couronnées, qui apparaissent facilement sous arcure.
Variété à mise à fruit rapide, ne produisant naturellement qu'un an sur deux.
Cependant ses coursonnes, portant majoritairement des brindilles couronnées, peuvent se désynchroniser et ainsi produire les unes, l'année en cours, et les autres, l'année suivante.
Cette situation est obtenue généralement par l'extinction* des bourgeons en surnombre et un éclaircissage précoce des fruits.

Variété peu sensible à la tavelure sur feuilles, indemne sur fruits, assez peu sensible aux pucerons cendrés.

Cependant les résultats du test réalisé par l'INRA d'Angers par inoculation en serre de souches de races communes de tavelure sur variétés greffées sur porte-greffe vigoureux sont contradictoires : sensible avec sporulation. Il semblerait que les faibles attaques notées en verger soient liées à une résistance mécanique de l'épiderme des feuilles et des fruits.



Alterne à la coursonne mais peut faire fruit sur fruit sur brindilles couronnées.