


moyennement sucrée et juteuse à la récolte, sa qualité s'améliorant après la récolte. Cette aptitude à la conservation avait été remarquée à l'INRA dans les années 1950 ; elle peut durer plus de sept mois en conditions naturelles.

Arbre moyennement vigoureux, très érigé, avec des ramifications acrotones longues et grêles, à type de fructification* III à IV, présentant une production en extrémités de branches qui lui donne un port ouvert en ombrelle. La forte extinction* des bourgeons provoque une dénudation importante du premier tiers des rameaux, ce qui facilite l'aération interne de l'arbre. L'alternance* à la coursonne est générale, mais la présence de brindilles couronnées en bout de branches fruitières permet à l'arbre de ne pas alterner. Feuilles très pubescentes sur la face inférieure.

Variété assez sensible à la tavelure sur feuilles et sur fruits, faiblement sensible aux pucerons. Les fruits sont remarquablement peu sensibles aux parasites de conservation.

Résultat des tests INRA/PV de comportement au feu bactérien par inoculation de souches bactériennes sur pousse : Résultats variables selon les années, de moyennement sensible à fortement sensible.



DIFFÉRENTES « CALVILLE ROUGE » PRODUITES DANS LE SUD-OUEST

Calville rouge de Charente, Caramilde, Caramile A051



Localement, nous trouvons cette variété sous l'appellation de « **Calabilhe** », nom déformé en **Carabilhe** et **d'Escarbilhe** (*Dictionnaire du Béarnais et du gascon moderne*, 1874). On retrouve cette appellation depuis la Charente limousine jusqu'à dans le Lot et l'Aveyron, dans le Rouergue. Mais dans cette zone le fruit est différent (voir paragraphe Aveyron). **Maturité** : mi précoce (récolte 25 septembre), faible conservation (un mois)

Floraison : mi-précoce à moyenne, pleine floraison en deuxième décade d'avril.

Fruit de calibre moyen, arrondi aplati, légèrement conique, régulier. Pédoncule court inséré dans une cuvette assez peu profonde évasée. Œil petit, fermé dans une cuvette peu profonde, de la largeur de l'œil, très plissée. **Épiderme** brillant, devenant cireux, uniformément rouge foncé, avec une cuvette de l'œil plus verdâtre. Lenticelles claires nombreuses et liège en zone pédonculaire ocre clair rugueux.

Chair très tendre, assez fine, blanche, qui présente une coloration caractéristique rosée, parfois jusqu'au cœur, parfois uniquement sous l'épiderme et le long des faisceaux formant le cœur. Elle est très juteuse, très sucrée, moyennement acidulée, parfumée, de bonne qualité.

Arbre peu vigoureux, semi-dressé retombant, de type II de fructification*. Il se dénude facilement en raison d'une importante extinction* des bourgeons. Les réitérations* sur arcures sont fréquentes. On constate un retour à fruit malgré des pousses de bourses très courtes.



Les coursonnes produisent fréquemment fruit sur fruit, et cette variété fructifiant régulièrement chaque année peut être considérée comme un modèle de régulation naturelle de la fructification.