

Caprane, Ovale jaune, prune Aumont



Variété-population fréquente dans les Landes et la Gironde, ayant donné naissance à plusieurs clones caractérisés par leur récolte en deux périodes, la première sur le bois jeune en extrémité, et la seconde au centre de l'arbre sur bois âgés et moins éclairés.

Origine : Landes


Maturité : troisième et dernière semaines de juillet, parfois première semaine d'août – échelonnée

Floraison : très tardive (25 mars - 8 avril), fleurs très parfumées

Fruit de calibre moyen, ovale allongé bombé au centre et pointu aux pôles, et une suture ventrale marquée. Épiderme orange, teinté de rouge-orangé puis rose foncé à l'insolation.

Chair orangée, charnue, très sucrée, juteuse, acidulée. Noyau libre, pointu aux deux extrémités et piquant. L'**arbre** est vigoureux, sa structure comme sa ramification sont érigées, avec angles fermés à l'état jeune. Cette ramification acrotone est très florifère : on observe des paquets de fleurs sur bois âgés de 2 ans mais peu sur ceux de 1 an. Les bouquets de mai s'empilent les uns sur les autres et peuvent ainsi être à l'origine de rameaux longs. Cette variété peut alterner sa production sur des secteurs de l'arbre trop chargés l'année précédente.

Population sensible au monilia sur fruit.



L'empilement des bouquets de mai, chiffonnes ou l'inverse constituent de véritables rameaux fructifères.

Prunier de Carrenac, Oustenque bleue



Origine : Lot, Lot-et-Garonne

Maturité : dernière semaine de juillet, deux premières semaines d'août, échelonnée

Floraison : précoce, débourrement précoce

Fruit de petit calibre, parfaitement rond, présentant un pédoncule court et une légère dépression ventrale marquée par un trait. Épiderme fin, violet foncé couvert d'une épaisse pruine bleuâtre. La maturité s'échelonne, les premiers fruits mûrs qui deviennent violet noirâtre chutent tandis que les autres restent bleutés et très fermes.


Chair vert jaunâtre, dense, tendre, moyennement sucrée, très parfumée, à noyau libre de petit calibre allongé aplati.



C'est un très bel **arbre**, très vigoureux. Érigé et acrotone, sa frondaison ploie sous le poids des fruits. On observe fréquemment des réitérations sur l'arcure des branches. Sa floraison est abondante, y compris sur jeunes rameaux âgés de 1 an. Cette variété produit essentiellement sur bouquets de mai distribués sur des rameaux longs dans la partie distale des structures de l'arbre. Sur les branches affaissées à l'horizontale, ces bouquets de mai peuvent être prolongés par une ou deux chiffonnes.

La fructification s'éteint vers le centre et le bas de l'arbre. Le prunier de Carrenac semble produire régulièrement.

Variété rustique, au bon comportement au monilia.



Les bouquets de mai s'empilent (4 années). Ils sont souvent prolongés d'une chiffonne.



Prune de chien, *Pruna de can*



Origine : Landes

Maturité : échelonnée du 10 août à la fin du mois d'août

Floraison : floraison très précoce (même époque que la prune Saint-Jean jaune) (18-26 mars), probablement autofertile, débourrement mi-précoce

Arbre typique des hautes Landes, sélectionné localement pour faire un fruit à confiture. Le fruit est petit et sans qualité gustative suffisante pour être consommé cru. En revanche, sa réputation pour faire des confitures de qualité n'est plus à faire dans cette zone. L'arbre est d'une rusticité sans égale, d'un niveau de tolérance aux maladies extrêmement élevé et particulièrement bien adapté à ces régions sableuses très difficiles pour le prunier.

Sa ploïdie* n'a pas été étudiée mais il semblerait que son comportement et son feuillage soient proches des Damas pentaploïdes (à 40 chromosomes).

Fruit de calibre petit à moyen, de forme arrondie.

Épiderme bleuté violacé, couvert d'une pruine blanche moyennement abondante.

Pédoncule assez court et très adhérent.

Chair verte, à noyau adhérent, peu juteuse, acidulée et peu sucrée, de qualité gustative médiocre.


Ce fruit nécessite d'être transformé, en confiture en particulier.

C'est typiquement un **arbre** de haie, de forte vigueur, très ramifié à port retombant et buissonnant.

Excessivement florifère et à floraison très précoce, il produit sur tous les types de fructification.

Les bouquets de mai peuvent s'empiler dans le temps.

Variété moyennement rustique, résistante aux gelées tardives, sensible aux pucerons farineux et au monilia sur fruit.



Très florifère, produit sur tous les organes de fructification.

