

Royale de Montauban, Cœur de bœuf, Grosse Bleue, Goliath, Bleue impériale, Royale, Royale de Carcassonne



Cette variété a probablement été introduite vers 1854 depuis la région de Lérida en Espagne, vers celle de Carcassonne où elle a ensuite été sélectionnée. Il s'agit d'une variété-population possédant de nombreux clones, largement multipliés dans le Sud de la France, de la région de Carcassonne jusqu'à l'Atlantique. Il s'en est fait un commerce assez important dans la région de Montauban au début du ^{xx} siècle, qui a duré jusque dans les années 1960. Cette variété, peu appréciée des consommateurs français, l'a été en revanche en Angleterre où, grâce à sa bonne résistance au transport et sa bonne conservation, elle fut longtemps exportée.

Origine : Tarn-et-Garonne

Maturité : débute la première semaine d'août se poursuit pendant plus de deux semaines, parfois jusque début septembre

Floraison : très tardive (27 mars - 2 avril), auto-incompatible

Fruit arrondi allongé, de gros calibre. Épiderme de couleur uniforme, noir à reflets rougeâtres, couvert d'une pruine abondante bleu ardoisé.




Chair vert jaunâtre présentant quelques traînées rouges sous la peau, à grain moyen, à noyau presque libre, moyennement juteuse, assez bonne mais manquant de parfum.

Arbre vigoureux, productif, très érigé dans son jeune âge, qui s'ouvre ensuite en parapluie sous le poids des récoltes. Le port de son arbre est érigé. Les axes formant la structure (charpentières) prédominent sur leur ramification.

La fructification peu importante directement sur la branche fruitière est plutôt positionnée sur sa ramification à l'âge de 2 ans. Ainsi, des brindilles et des chiffonnes deviennent porteuses de bouquets de mai. Cette position périphérique des fruits provoque l'arcure des branches.

Cette variété produit sur bouquets de mai et chiffonnes avec une floraison abondante en position latérale aux bois âgés de 1 an.

Rusticité très importante (malgré une sensibilité à la rouille), très bonne résistance à l'éclatement des fruits avant maturité, bonne résistance à la chute, très faible sensibilité au monilia sur jeune pousse et sur fruit.



Produit sur bouquets de mai et chiffonnes. Localisées sur bois de 2 et 3 ans.